MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

DLP 23-8-56 080400

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)

. MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

Quatrième année nº 37 Edition générale nº 6 22 août 1956.

AVERTISSEMENTS

CARPOCAPSE - TAVELURE - TORDEUSE

Toutes zones

Les précipitations enregistrées dans l'ensemble de la circonscription, ainsi que les températures parfois élevées que l'on a enregistrées rendent indispensables l'exécution d'un traitement mixte qui assurera la protection des fruits jusque vers le 20 septembre.

Ce traitement doit être terminé avant le Ier septembre.

INFORMATIONS

OIDIUM DU PECHER

Dans les pépinières ou les vergers dont la cueillette est terminée, il est conseillé de faire un traitement en pulvérisation à base de soufre micronisé (250 gr de matière active par Hl) ou de soufre dispersé (500 gr de matière active par Hl).

Faire ce traitement en dehors des heures chaudes de la journée.

LES PARASITES DES CRUCIFERES : CHOUX, CHOUX FLEURS, NAVETS, etc...

Altises : Ces petits insectes attaquent les semis et les plantes des diverses crucifères. Faire une application d'un insecticide à base d'H.C.H. ou de D.D.T. en donnant la préférence aux poudrages.

Piérides et Noctuelles : Les chenilles de plusieurs espèces de papillons peuvent attaquer les diverses crucifères. Faire, dès les premières attaques, une application avec un insecticide à base de D.D.T. en donnant la préférence aux poudrages.

La résistance des noctuelles croît avec l'âge : effectuer les traitements lorsque les chenilles sont encore jeunes.

Punaises : Dès les premiers dégâts, effectuer des traitements avec un insecticide à base d'ester phosphorique, de lindane, de roténone ou de D.D.T.

LES PARASITES DU CHRYSANTHEME

De nombreux échecs dans la culture des chrysanthèmes sont dus à deux causes principales :

I) Anguillule des feuilles : qui provoque au printemps et en été le jaunissement et plus tard le noircissement d'une partie des feuilles.
Faire périodiquement par beau temps chaud des applications d'insecticide à base de parathion.

2) Septoriose : maladie cryptogamique qui provoque de petites taches brunes, nettement délimitées qui entraînent le dessèchement du feuillage à l'automne avant l'ouverture des fleurs. Faire périodiquement des applications d'un anticryptogamique à base de :
- Captane - T.M.T.D. - Zinèbe - Ziram

L'Inspecteur : P.BERVILLÉ Le Contrôleur : L.L.TROUILLON

P 158

Imprimé à la Station d'Avert. Agricoles du Langu.-Roussillon, I6 rue République Montpellier
Le Gérant : TROUILLON. Autor. du 6 Mars 1956 - Reproduction, adaptation réservées.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)
- MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

Ministère de l'Agriculture

Ecole Nationale d'Agriculture
de Montpellier

STATION REGIONALE
d'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Montpellier, le 3I Août I956.

Note n° I3

EUDEMIS

Le vol des papillons de troisième génération se poursuit.

Il vient d'apparaître à Latour de France, Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales) ainsi qu'à Douzens et Capendu (Aude).

Pour ces vignobles, ceux dont le climat est analogue et qui souffrent habituellement d'eudémis, il y aurait lieu d'effectuer, dès le Ier septembre, le traitement correspondant et de le renouveler une dizaine de jours après.

Par ailleurs, la répétition du traitement - déjà indiqué pour Fontès, Caux, Aspiran, St-Geniès-le-Bas - s'impose en raison de la durée et de l'importance des vols constatés sur ces communes.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles :

G.BERNON

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon -
I6, rue de la République - MONTPELLIER. Le Gérant: TROUILLON, Autor. du 6 Mars I9